



DEMONSTRACE LÉČBY

TŘÍLETÁ FENA ČESKÉHO STRAKATÉHO PSA DELI

Šest týdnů po porodu štěnat byla diagnostikována Mastitis Purulenta Abscedens.


Osmý týden po vypuknutí defektu byla chirurgicky odstraněna nekrotická tkáň. Objevila se rána 10,5 x 11 cm. Ošetřeno antibiotiky, rána byla opláchnuta Betadinem, později Tenazymem a pokryta prostředkem Atrauman.

Po jednom týdnu léčby byl aplikován prostředek ACAVET.



www.aca.vet
info@aca.vet

19. července 2019
POČÁTEČNÍ STAV




23. července 2019

DEN 5

Rozměr defektu – 8 cm

Redukce rozměru defektu o 2.5 cm

Rána je čistá, začíná rapidní proces hojení.



27. července 2019


DEN 9

Rozměr defektu – 6.5 cm

Redukce rozměru defektu o 5 cm

Bylo ukončeno použití antibiotik.

Dno defektu se rapidně zaceluje novou tkání.




30. července 2019

DEN 12

Rozměr defektu – 4.5 cm


Redukce rozměru defektu o 6 cm

Nová tkáň viditelná na okrajích defektu.



7. srpna 2019
DEN 20

Rozměr defektu – 3.5 cm
Redukce rozměru defektu o 7 cm



11. srpna 2019
DEN 24

Rozměr defektu – 2.5 cm

Redukce rozměru defektu o 8 cm

Začíná formování hypergranulace.



19. srpna 2019
DEN 32

Rozměr defektu – 1 cm



Redukce rozměru defektu o 9.5 cm

Hypergranulace byla chirurgicky odstraněna, ACAVET byl používán ještě dva dny.
Po třech dnech se vytvořil strup který se následně po pěti dnech se oddělil.



Pět dní od aplikace prostředku ACAVET byla rána zcela vyčištěna a byl zahájen proces rychlé tvorby nové tkáně. Antibiotika byly vysazeny devátý den léčby. Po 35 dnech se rána zcela uzdravila. V průběhu léčby prostředkem ACAVET nebyly použity žádné jiné léky kromě antibiotik.

Celková spotřeba prostředku ACAVET – 17 kusů.





DĚKUJEME ZA POZORNOST
A TĚŠÍME SE NA ÚSPĚŠNOU
SPOLUPRÁCI



www.aca.vet
info@aca.vet

